

قابلیت اقلیمی کشت زعفران در استان‌های کرمانشاه و کردستان

چکیده

یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی غیر باعی ایران که شهرت جهانی دارد، محصول استراتژیک زعفران است. در حال حاضر قطب تولید زعفران، منطقه شمال شرق ایران (استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی) است. در این پژوهش سعی شده است تا مناطق مستعد کشت زعفران در غرب کشور (استان‌های کرمانشاه و کردستان) که از لحاظ شرایط آب و هوایی تا حدی شبیه شرق کشور است، شناسایی شود. بر این پایه، آمار عناصر آب و هوایی مؤثر در رشد زعفران، شامل: بارش، دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و تعداد روزهای یخنیان برای ۱۱ ایستگاه منطقه در سه دوره رشد محصول (رویشی، زایشی و رکود) جمع آوری و با یک جدول پایه جدید، مقایسه گردید تا مناسب بودن یا نبودن شرایط برای کشت محصول در یک دوره خاص برای هر متغیر اقلیمی مشخص شود. سپس بر مبنای روش وزن دهی نسبتی، درجه اهمیت یا وزن هر کدام از متغیرهای اقلیمی در هر دوره رشد مشخص شد. در مرحله بعد، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه‌های تناسب کشت زعفران به روش رستری با در نظر گرفتن درجه اهمیت (وزن) هر متغیر اقلیمی در هر دوره رشد تهیه گردید. با جمع زدن ارزش‌های پیکسل‌ها در سه دوره رشد، نقشه تناسب هر متغیر (مجموعاً ۱۱ نقشه) و با میانگین‌گیری از ارزش‌های پیکسل‌ها در این ۱۱ نقشه، نقشه تلفیقی تناسب کشت حاصل گردید. در نهایت، با لحاظ کردن شب و محدوده ارتفاعی مناسب برای کشت زعفران در نقشه‌اخیر، نقشه نهایی تناسب کشت زعفران تهیه شد. نتایج پژوهش نشان داد که نزدیک به $30/48$ درصد از مساحت منطقه (معادل 16500 کیلومتر مربع)، عمدها شامل دشت‌های غرب کرمانشاه، جنوب روانسر و اطراف فروه، قابلیت متوسطی برای کشت زعفران دارد. بقیه قسمت‌های منطقه مشتمل بر حدود 37600 کیلومتر مربع ($69/48$ درصد از مساحت منطقه)، قابلیتی برای کشت این محصول ندارد.

واژه‌های کلیدی: قابلیت اقلیمی، زعفران، غرب ایران، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش وزن دهی نسبتی

مقدمه

زعفران^۱ با نام علمی *Crocus sativus* L. گیاهی است از خانواده زنبقیان^۲ که به دلیل عقیم بودن گل، از طریق پیاز تکثیر می‌یابد. این گیاه، دارای استفاده‌های گسترده غذایی (عطر، طعم و رنگ‌دهنده)، رنگ آمیزی، دارویی و بهداشتی است؛ تا آنجا که بر اساس مطالعات اخیر، استفاده از آن به عنوان عاملی شفابخش و پیشگیری کننده در برابر انواع سرطان‌ها مطرح شده است (رضوانی و همکاران، ۲۰۱۲: ۴۱). نخستین زعفران‌زارهای جهان توسط ایرانیان در ایالت باستانی "ماد" در نواحی الوند و دامنه‌های زاگرس گوارش شده که بعداً به دیگر نواحی ایران و جهان گسترش یافته است. طبق مستندات موجود، اکثر مناطق زعفران خیز گذشته و کنونی جهان، در فاصله عرض‌های جغرافیایی ۲۹ تا ۴۰ درجه شمالی، بین آسیای مرکزی در شرق تا اسپانیا در غرب پراکنده شده و خارج از این محدوده به دلیل مهیا نبودن شرایط رشد و نمو این گیاه، امکان تولید آن بسیار کم و نادر است. از مهم‌ترین مراکز تولید زعفران در دنیا از گذشته تاکنون می‌توان به کشمیر، چین، سوریه، شمال آفریقا، اسپانیا و یونان اشاره نمود (ابراهیم‌زاده و بذرافشان، ۱۳۸۶: ۶۵).

زعفران گرانبهاترین محصول کشاورزی ایران و جهان است و از لحاظ سوددهی و ارزآوری محصولی استراتژیک به شمار می‌رود؛ به طوری که آن را طلای سرخ نامیده‌اند. این گیاه یکی از اقلام صادراتی غیر نفتی ایران است که سالیانه عایدات ارزی خوبی برای کشورمان دارد. ارزش صادرات زعفران در سال ۱۳۸۲ برابر با ۶۶/۵۷ میلیون دلار بوده که ۴/۵ درصد از کل صادرات کشاورزی کشور را تشکیل داده است (رحمانی، ۱۳۸۵: ۶). این رقم در سال ۱۳۸۳ نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸، ۱۷۹ میلیون دلار^۳، در سال ۱۳۸۹، ۲۵۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰، ۳۶۶ میلیون دلار^۴ و در سال ۱۳۹۱، ۴۱۰ میلیون دلار بوده است.^۵

در حال حاضر تنها در شرق و شمال شرق کشور به طور وسیع و تجاری به کشت زعفران پرداخته می‌شود؛ به طوری که از مجموع ۷۳۱۱۹ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در کشور، ۵۷۲۷۵ هکتار (۷۸ درصد) در استان خراسان رضوی، ۱۲۹۹۰ هکتار (۱۸ درصد) در استان خراسان جنوبی، ۲۲۹۰ هکتار (۳ درصد) در استان‌های یزد، خراسان شمالی، فارس، اصفهان و کرمان، و حدود یک درصد در سایر استان‌ها قرار دارد. هم‌اکنون ایران با ۲۵۴ تن تولید بزرگ‌ترین تولید کننده زعفران در جهان است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۰ مجموع تولید زعفران در جهان ۲۷۴ تن بوده که ۹۲ درصد آن را ایران و هشت درصد آن را سایر کشورهای جهان تولید کرده‌اند.^۶ در حال حاضر در کشور ۳/۹ کیلوگرم زعفران از هر هکتار برداشت می‌شود، درصورتی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میزان برداشت زعفران از هر هکتار ۵ کیلوگرم بود که با احتساب آن باید میزان تولید زعفران در حال حاضر به ۴۰۰ تن می‌رسید. هم‌اکنون هر کیلوگرم زعفران حدود چهار میلیون تومان به فروش می‌رسد^۷؛ از آماری که به گونه‌ای نه‌چندان دقیق درباره زعفران و زعفران‌کاران ایرانی منتشر می-

۱- Saffron

۲- Iridaceae

۳- www.worldfood.ir

۴- به نقل از کیومرث فتح‌الله کرامانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت (www.shatanews.ir)۵- به نقل از فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران در تاریخ ۹۲/۱۰/۳ (www.ghatreh.com)۶- به نقل از ناصر توکلی معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۹۱/۱۱/۳ (www.dolat.ir)۷- به نقل از علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در تاریخ ۹۲/۱/۳۰ (www.isna.ir)

شود، چنین بر می‌آید که بیشتر از صد هزار خانوار، بهویژه در گناباد، قاین، بیرجند و فردوس خراسان، از این محصول روزگار می‌گذرانند (رحمانی، ۱۳۸۵: ۵).

دلایل زیادی وجود دارد که ضرورت توسعه سطح زیر کشت این محصول را توجیه می‌کند که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱- نیاز آبی اندک زعفران، بهویژه با توجه به وقوع خشکسالی‌های پی درپی سال‌های اخیر؛ ۲- تقویم نیاز آبی، که مناسب اقلیم نیمه‌خشک و خشک ایران است (نیاز آبی این گیاه در پاییز و زمستان است)؛ ۳- اشتغال‌زایی قابل توجه برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان؛ ۴- صادرات و ارزآوری مناسب با توجه به بازارهای مناسب این محصول؛ ۵- کمی آفات و امراض زعفران.

در زمینه مطالعات اقلیمی برای کشت زعفران، تحقیقاتی صورت گرفته است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود. شروع فصل گل‌دهی زعفران همزمان با شروع سرمای پاییزه قلمداد و یک گیاه مقاوم به سرما معرفی شده است (عزیز بکوا و همکاران^۸، ۱۹۷۸: ۴۷۱). درجه حرارت متوسط سالانه به میزان $5/9$ تا $18/6$ درجه سانتی‌گراد و PH متوسط 6 تا $7/8$ در کشور نیوزلند برای کشت زعفران مناسب تشخیص داده شده است (مک‌گیمپسی و دوگلاس^۹، ۱۹۹۷: ۱۶۰). این گیاه، بومی مناطق آب‌وهوایی مدیترانه‌ای با زمستانی ملایم تا سرد و تابستانی گرم و خشک است (رانگاهائو^{۱۰}، ۲۰۰۳: ۱).

خصوصیات اقلیمی مناطق و نواحی کشت زعفران را تابستان گرم و خشک و بهار و پاییزی نسبتاً ملایم و به طور کلی آب‌وهوای نسبتاً خشک و معتدل دانسته‌اند (شاهعلایی، ۱۳۵۲: ۸۷). درجه حرارت تقریبی 20 -درجه سانتی‌گراد در فصل زمستان تا $+40$ درجه سانتی‌گراد در فصل تابستان و نیز بارندگی $150-300$ میلی‌متر، محدوده‌های اقلیمی مناسب برای کشت زعفران به شمار می‌آید (طباطبایی، ۱۳۶۵: ۷۶۵). کشت زعفران در دشت‌ها و دامنه‌های آفتاب‌گیر که زمستانی بسیار سرد و سخت نداشته و تابستانی گرم و آفتابی و نسبتاً خشک، و بهار و پاییزی ملایم داشته باشد، امکان‌پذیر است (ابرشیمی، ۱۳۶۶: ۲۰۹). فرایند ترکیبات شیمیایی و شرایط مناسب کشت این محصول، بارندگی کمتر از 400 میلی‌متر در سال و متوسط درجه حرارت کمتر از 30 درجه سانتی‌گراد در تابستان است (حبیبی و باقری، ۱۳۶۸: ۱۸). در زمینه ارتباط عمر زعفران با گل‌دهی در شرایط آب‌وهوایی منطقه کرج، دماهای بین 9 تا 15 درجه سانتی‌گراد برای گل‌دهی زعفران مؤثر تشخیص داده شده، همچنین، رژیم‌های حرارتی این گیاه در مراحل مختلف رشد در این منطقه معرفی شده است (بری ابرقویی، ۱۳۷۸: ۴). شرایط اقلیمی مناسب برای کشت این محصول از نظر دمای حداکثر، بین $35-40$ درجه سانتی‌گراد و از نظر ارتفاع، بین $1300-2400$ متر از سطح دریاست (امیرقاسمی، ۱۳۸۰: ۳۱). گیاه زعفران از لحاظ تقویم آبی، مناسب اقلیم مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران است؛ زیرا آبیاری این گیاه در فصول بارندگی؛ یعنی پاییز و زمستان صورت می‌گیرد (شیبانی و همکاران، ۱۳۸۱: ۶). این گیاه، از جمله گیاهان مقاوم به سرما در مناطق خشک و نیمه‌خشک معرفی شده است (محمدی و کریم‌پور، ۱۳۸۴: ۲۲۳). همچنین، محدوده ارتفاعی $1300-2300$ متر و شیب کمتر از 8 درصد برای رشد آن مناسب تشخیص داده شده است (فرج‌زاده و میرزاپیاتی، ۱۳۸۶: ۷۳) و یزدچی و همکاران، ۱۳۸۹:

⁸- Azizbekova et al.

⁹- McGimpsey & Douglas


¹⁰- Rangahau

۱۵۴). زعفران بخش بیشتری از دوره رشد خود را در فصل سرد و مرطوب سال می‌گذراند و بهدلیل بارش باران و نیاز کمتر به آبیاری در این فصل، گیاه مناسبی برای کاشت در مناطق نیمه‌خشک است (علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰۹). لذا بهدلیل آنکه نیاز آبی این گیاه با شروع بارندگی‌های ایران همزمان است، نیاز چندانی به آبیاری ندارد. از نظر دمایی، دماهای بین ۹ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد در دوره زایشی، ۱۸-۲۰ درجه سانتی‌گراد در دوره رویشی و کمتر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد در دوره رکود برای رشد زعفران مناسب است (یزدچی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۵۳-۱۵۴). با توجه به تحقیقات بالا می‌توان گفت که چون این گیاه در فصل تابستان در استراحت کامل به سرمه برد و در برابر گرمای زیاد و همچنین سرمای زیاد مقاوم است و نیاز چندانی به آبیاری ندارد، قابلیت کشت و توسعه سطح زیر کشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک را دارد.

تشابه نسبی شرایط اقلیمی غرب و شرق کشور، اهمیت زعفران در صادرات غیرنفتی و رقابت با رقیب سرخختی همچون اسپانیا که توانسته است بازارهای جهانی را از آن خود نماید، و بهخصوص مقابله با تک‌قطبی بودن منطقه کشت، از جمله دلایلی است که انجام مطالعات بهمنظور افزایش مناطق زیر کشت و یافتن نواحی جدید را که به لحاظ اقلیمی، مناسب کشت این محصول استراتژیک باشد، ضروری می‌نماید. از این‌رو، هدف این تحقیق، یافتن مکان‌های مناسب برای کشت زعفران در استان‌های کرمانشاه و کردستان واقع در غرب کشور با توجه به شرایط اقلیمی منطقه است.

داده‌ها و روش پژوهش

محدودهٔ مورد مطالعه در این پژوهش، دو استان کرمانشاه و کردستان در غرب کشور با مساحتی بالغ بر ۵۴۱۳۵ کیلومتر مربع (در حدود ۳/۲ درصد از کل مساحت کشور) هستند (شکل ۱). این منطقه بین طول‌های جغرافیایی' ۲۴° ۴۵' الی' ۱۶° ۴۸' شرقی و عرض‌های جغرافیایی' ۳۰° ۳۳' الی' ۳۶° ۴۲' شمالی واقع شده و از شمال به استان آذربایجان غربی، از جنوب به استان‌های لرستان و ایلام، از شرق به استان‌های همدان و زنجان و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود.



شکل ۱) موقعیت منطقهٔ مورد مطالعه در کشور

آب و هوای منطقه تحت تأثیر عوامل متعددی است. از طرفی، رشته کوه زاگرس که در گستره‌ای از شمال‌غربی به جنوب‌شرقی کشیده شده است، به طور کلی، منطقه غرب ایران را از قلمرو مرکزی آن جدا می‌کند و از سوی دیگر، قرار گرفتن در معرض وزش بادهای مرطوب غربی و جابه‌جا شدن توده‌های هوای گرم و مرطوب سودانی و نیز شرایط پیچیده ناهمواری (تغییرات ارتفاعی)، موجب گوناگونی آب و هوای در منطقه شده است. "متوسط بارش سالانه منطقه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر است" (علیجانی، ۱۳۸۴: ۱۷۷).


این منطقه در محدوده رشته کوه‌های زاگرس واقع شده است. در بخش شمال‌غربی آن که عمدتاً مساحت استان کرمانشاه نیز در آن واقع است، امواج چین خوردگی، بیشتر به صورت ساختهای تاقدیسی و ناویدیسی مرکب تظاهر پیدا کرده است. از این رو، دشت‌های نسبتاً وسیع و کوه‌های تقریباً پر حجم، از اختصاصات این بخش از زاگرس است که در آن اغلب دشت‌ها منطبق بر ناویدیس‌های مرکب (دشت اسلام‌آباد) و برجستگی‌های بین آنها حاصل تاقدیس‌های مرکب (دلاهوا) است. در بخش شمال‌غربی زاگرس، محور چین‌ها شمال‌غربی-جنوب‌شرقی است و به طور کلی، بی‌نظمی زیاد در چین‌ها دیده نمی‌شود. با توجه به قرارگیری در مسیر بادهای مرطوب غربی و برخوردار بودن از بارش نسبتاً زیاد، دشت‌های ناویدیسی بین کوه‌ها، زمین‌های کشاورزی حاصلخیزی را تشکیل داده است. ماهیدشت از وسیع‌ترین و حاصل‌خیزترین دشت‌های زاگرس در این منطقه محسوب می‌شود (علیجانی طالقانی، ۱۳۸۷: ۱۵۴). بخشی از شرق استان کرمانشاه نیز در محدوده زاگرس مرتفع قرار گرفته است.

استان کردستان در محدوده زون سنتوج-سیرجان قرار گرفته است که دشت‌های آن عمدتاً از نوع فرسایشی است. بلندترین قله منطقه، شاهو با ارتفاع ۳۳۹۰ متر و پست‌ترین نقطه آن، دشت سومار با ارتفاع ۳۰۰ متر است (مصطفایی و همکاران، ۱۳۸۳: ۶-۳). بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ و تقسیمات کشوری سال ۱۳۸۹، این دو استان مجموعاً دارای ۲۳۱۹۵۴۱ نفر جمعیت هستند که در ۲۴ شهرستان، مشتمل بر ۵۷ بخش، ۵۴ شهر و ۱۶۹ دهستان ساکن هستند.^{۱۱}

با توجه به تعدد متغیرهای اقلیمی مؤثر بر کشت زعفران، در این پژوهش بر متغیرهایی که بیشترین نقش را در رشد، نمو و بارآوری آن دارند، تأکید شده است. این متغیرها عبارتند از: مقادیر ماهانه میانگین بارش، میانگین دما، میانگین حداقل دما، میانگین حداکثر دما، حداقل مطلق دما، حداکثر مطلق دما، تعداد ساعات آفتابی، تعداد روزهای یخ‌بندان، رطوبت نسبی صبح، رطوبت نسبی عصر و میانگین رطوبت نسبی. آمار متغیرهای فوق در یک دوره ۱۹ ساله (۱۹۸۷-۲۰۰۵) از تارنمای سازمان هواشناسی کشور^{۱۲} یا سالنامه‌های هواشناسی آن سازمان برای ۱۱ ایستگاه منطقه با پراکنش مناسب در سطح منطقه (شکل ۲) جمع‌آوری شد. داده‌های مفقود اقلیمی به مدت یک یا دو سال در برخی از ایستگاه‌ها، شامل مریوان، قروه، زرینه، روانسر و اسلام‌آباد، بر حسب مورد، با استفاده از روش تفاضل‌ها یا نسبت‌ها بازسازی شد.

۱۱- <http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=115>

۱۲- www.irimet.net



شکل ۲) نقشه موقعیت ایستگاه‌های سینوپتیک در منطقه مورد مطالعه

جدول ۱) مشخصات جغرافیایی و آماری ایستگاه‌های مورد مطالعه

نام ایستگاه	طول جغرافیایی (شرقی)	عرض جغرافیایی (شمالي)	ارتفاع (متر)
بیجار	۴۷° ۳۷'	۳۵° ۵۳'	۱۸۸۳/۴
سندهج	۴۷° ۰۰'	۳۵° ۲۰'	۱۳۷۳/۴
زرینه اویاتو	۴۶° ۵۵'	۳۶° ۰۴'	۲۱۴۲/۶
مریوان	۴۶° ۱۲'	۳۵° ۳۱'	۱۲۸۶/۸
سقز	۴۶° ۱۶'	۳۶° ۱۵'	۱۵۲۲/۸
قروه	۴۷° ۴۸'	۳۵° ۱۰'	۱۹۶۰
کرمانشاه	۴۷° ۰۹'	۳۴° ۲۱'	۱۳۱۸/۶
روانسر	۴۶° ۳۹'	۳۴° ۴۳'	۱۳۷۹/۷
کنگاور	۴۷° ۵۹'	۳۴° ۳۰'	۱۴۶۸
اسلام آباد	۴۶° ۲۸'	۳۴° ۰۷'	۱۳۴۸/۸
سرپل ذهاب	۴۵° ۵۲'	۳۴° ۲۷'	۵۴۵

از نظر مراحل رشد فنولوژیک، گیاه زعفران در طول سال دارای سه دوره رشد زایشی (ابتدا تا انتهای آبان‌ماه)، رویشی (اول آذر تا آخر اردیبهشت) و رکود (اول خرداد تا آخر مهر) است که در هر دوره، متغیرهای اقلیمی به تناسب نیاز گیاه نقش متفاوتی در رشد و نمو آن ایفا می‌کنند. بدلیل آنکه دوره رشد گیاه، چه زایشی و چه رویشی، با شروع بارندگی‌ها در فصول پاییز و زمستان همزمان است، بارش برای این گیاه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما برخلاف سایر گیاهان در فصل رویش نیاز چندانی به آبیاری ندارد. از نظر تعداد ساعت‌آفتابی چون دوره رشد و گل‌دهی زعفران

با فصل زمستان مطابق است، در این فصل ساعات آفتابی همراه با بارش زمستانی شرایط رشد گیاه را به وضعيت ایده‌آل می‌رساند. همچنین، تعداد روزهای یخ‌بندان در دوره گل‌دهی گیاه دارای اهمیت بالایی است؛ به طوری که باعث کاهش گل‌دهی محصول می‌شود. بنابراین، حد تحمل این گیاه برای یخ‌بندان، چه در دوره زایشی و چه در دوره رویشی دارای اهمیت است. در مجموع، زعفران یک گیاه مقاوم به سرماست. همچنین، بدلیل اینکه این گیاه در فصل سرد و مرطوب سال رشد می‌کند، رطوبت نسبی برای آن اهمیت خاصی دارد؛ اما اهمیت آن به اندازه بارش و دما نیست. با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان گفت که زعفران از لحاظ تقویم اقلیمی، گیاهی منحصر به فرد تلقی می‌شود؛ چراکه دوران رشد و گل‌دهی این گیاه برخلاف سایر گیاهان در فصل سرد سال رخ می‌دهد و از این نظر، این تقویم با فصل بارشی ایران تطابق کامل دارد. از نیازهای اقلیمی این گیاه چنین بر می‌آید که به جز سواحل خزر و خلیج فارس با سایر مناطق کشور به خصوص مناطق سردسیر سازگاری نسبی دارد.

در کتاب زعفران از دیرباز تا امروز (ابریشمی، ۱۳۸۳: ۵۸۵) جدولی ارائه شده است که در آن بر مبنای آمار ایستگاه‌هایی از کشور که سابقه کشت زعفران دارند (مانند طبس، بیرجند، اصفهان، همدان و ...) آستانه‌های متغیرهای اقلیمی برای کشت این محصول ارائه گردیده است. از آنجا که در تنظیم این جدول، برای تمام متغیرهای اقلیمی از آمار میانگین ایستگاه‌های فوق استفاده شده است (در حالی که از پارامترهای مطلق نمی‌توان میانگین‌گیری کرد) با مشورت با متخصصان امر مقرر شد تا به منظور تعیین آستانه‌های عددی جدید برای متغیرهای اقلیمی در هر دوره رشد محصول، با در نظر گرفتن درجه تأثیر متغیرها در دوره‌های مختلف رشد، در نحوه تعریف ارقام آستانه تجدیدنظر شود؛ بدین ترتیب که با توجه به مقادیر متغیرهای ذکر شده در جدول ابریشمی، برای سه متغیر بارندگی، میانگین حداکثر دما و حداکثر مطلق دما، کمترین مقادیر ایستگاه‌های پایه^{۱۳}، برای سه متغیر تعداد روزهای یخ‌بندان، میانگین حداکثر دما و حداکثر مطلق دما، بیشترین مقادیر ایستگاه‌های پایه و برای سایر متغیرها، همان مقادیر ایستگاه‌های پایه جدول ابریشمی (طبس، بیرجند و ...) در نظر گرفته شد و بدین ترتیب، جدول پایه ماهانه جدید آستانه‌های اقلیمی زعفران تهیه گردید (جدول ۲).

در مرحله بعد، برای به دست آوردن جدول پایه دوره‌ای آستانه‌ها، از ارقام همین جدول (جدول ۲) استفاده شد؛ بدین ترتیب که در طی هر کدام از دوره‌های سه‌گانه رشد (دوره ذکر شده در سرستون جدول^{۱۴})، برای مقادیر بارش، یخ‌بندان و ساعت‌های آفتابی، از جمع ارقام ماههای دوره مربوطه (جدول ۲)، برای مقادیر میانگین رطوبت نسبی و دما، از میانگین ارقام ماههای دوره مربوطه و برای مقادیر حداکثر و حداکثر مطلق دما، به ترتیب از حداکثر و حداکثر ارقام ماههای دوره مربوطه (جدول ۲) استفاده و بدین ترتیب جدول ۳ تشکیل شد. پیکان‌های جدول ۳، حد مناسب بودن یا نبودن را نشان می‌دهد. برای مثال، در دوره زایشی، اگر مقدار بارندگی بیش از ۶/۲ میلی متر باشد، شرایط برای کشت محصول، مناسب و اگر کمتر از آن باشد، نامناسب است.

^{۱۳}- برای کسب اطلاع از مقادیر ایستگاه‌های پایه، به ابریشمی (۱۳۸۳) مراجعه نمایید.

جدول (۲) جدول پایه ماهانه جدید آستانه‌های اقلیمی برای کشت زعفران، اصلاح شده بر اساس جدول ایریشمی (۱۳۸۴۳)

ماه	متغیر آب و هوایی											
	بروزین	اربعین	شصتین	هزار	آستان	پنج	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجمین
بارندگی (میلی متر)	۱۵/۳	۴/۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵/۵
تعداد روزهای یخ زدن	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵/۸
تعداد ساعات آفتابی	۲۳۲	۲۸۸	۳۳۹	۳۴۶	۳۰۷	۲۷۵	۲۰۲	۱۷۹	۱۷۱	۱۸۷	۲۷/۷	۲۵/۱
رطوبت نسبی در ساعت ۶۰ (درصد)	۶۳	۵۴	۴۲	۴۰	۳۹	۴۲	۵۲	۶۶	۷۴	۷۷	۷۷	۶۸
رطوبت نسبی در ساعت ۱۲/۳۰ (درصد)	۳۴	۲۷	۲۰	۱۹	۱۸	۲۰	۲۵	۳۷	۴۷	۵۴	۴۸	۳۷
میانگین رطوبت نسبی (درصد)	۴۸	۴۰	۳۱	۲۹	۲۸	۳۱	۳۱	۵۲	۵۷	۶۱	۶۵	۵۱
میانگین حداکثر دما (C°)	۲۷/۶	۳۴/۱	۴۰/۳	۴۱/۸	۴۴/۳	۳۷/۳	۳۱/۲	۲۳	۲۰/۴	۱۴/۵	۱۷/۲	۲۶/۶
میانگین حداقل دما (C°)	۴	۷/۶	۱۰/۸	۱۴/۸	۱۳/۹	۹/۲	۴/۸	۰/۲	-۴/۳	-۶/۷	-۵	۰
حداکثر مطلق دما (C°)	۳۹	۴۴/۶	۴۶/۸	۴۸	۴۸/۲	۴۳	۳۸/۵	۳۰/۸	۲۲/۶	۲۶/۹	۲۹	۳۵/۶
حداکثر مطلق دما (C°)	-۱۲/۲	-۲/۸	-۲/۸	-۲	۶/۱	۵/۶	-۴/۲	-۷	-۲۸/۵	-۳۳/۵	-۳۲	-۱۳/۷
میانگین دما (C°)	۱۶	۲۲	۲۷	۲۹	۲۸	۲۴	۱۸	۱۰/۵	۸	۴	۶	۱۱

جدول (۳) جدول پایه جدید آستانه‌های اقلیمی برای کشت زعفران در دوره‌های سه‌گانه رشد

متغیر آب و هوایی	دوره زایشی (یک ماه)	دوره روزی (شش ماه)	دوره رکود (پنج ماه)
بارندگی (میلی متر)	از اول آذر تا آخر اردیبهشت	از اول خرداد تا آخر مهر	از اول خرداد تا آخر مهر
تعداد روزهای یخ‌بندان	↑ ۶۲	↑ ۶۵/۹	↑ ۱
تعداد ساعت آفتابی	↓ ۲۰۲	↓ ۱۲۵۹	↓ ۴/۷
رطوبت نسبی در ساعت ۶/۳۰ (درصد)	↑ ۶۶	↑ ۶۸	↑ ۴۳
رطوبت نسبی در ساعت ۱۲/۳۰	↑ ۳۷	↑ ۴۱/۲	↑ ۲۰
میانگین رطوبت نسبی (درصد)	↑ ۵۲	↑ ۳۱	↑ ۵۴
میانگین حداکثر دما (°C)	↓ ۲۳	↓ ۲۲/۵	↓ ۳۹
میانگین حداقل دما (°C)	↑ ۰/۲	↑ -۰/۷	↑ ۱۰/۷
حداکثر مطلق دما (°C)	↓ ۳۰/۸	↓ ۳۵/۶	↓ ۴۸/۲
حداقل مطلق دما (°C)	↑ -۱۶/۵	↑ -۳۳/۵	↑ -۷
میانگین دما (°C)	↓ ۱۰/۵	↓ ۱۱/۲	↓ ۲۵/۲

↑ بالاتر از این رقم برای محصول مناسب است. ↓ پایین تر از این رقم برای محصول مناسب است.

بعد از تهیه جدول پایه آستانه‌های اقلیمی برای دوره‌های سه‌گانه رشد (جدول ۳)، می‌بایست مشخص می‌شد که شرایط اقلیمی هر ایستگاه در هر دوره رشد، نسبت به شرایط آستانه چگونه است. بدین‌منظور، جداولی مشابه جدول ۳ (جدول پایه) برای هر ایستگاه، تهیه و سپس با جدول ۳ به عنوان جدول پایه مقایسه شد و نهایتاً مشخص گردید که آیا در یک دوره خاص شرایط برای کشت محصول از دیدگاه متغیرهای مختلف اقلیمی مناسب است یا خیر. برای مثال، در ایستگاه زرینه، چون میانگین دما در دوره زایشی از $10/5$ درجه سانتی‌گراد بیشتر بود، بنابراین، شرایط برای کشت محصول مناسب نبود، اما در دوره رویشی، چون دما از $11/2$ درجه سانتی‌گراد کمتر بود، شرایط برای کشت محصول مناسب بود. نتایج جدولی متغیرهای اقلیمی برای ایستگاه‌ها ارائه نشده است.

در گام بعد، برای تعیین درجه مناسب بودن، به دلیل آنکه هر متغیر اقلیمی در هر یک از دوره‌های رشد زعفران اهمیت متفاوتی دارد، ارزش یا وزن هر کدام از متغیرها در هر دوره مشخص شد. به‌منظور ارزش‌گذاری یا وزن‌دهی متغیرها که بعداً به وزن‌دهی لایه‌ها منجر شد، از روش وزن‌دهی نسبتی^{۱۴} (ESRI^{۱۵}) $50-39:1996:71$ استفاده شد؛ بدین‌ترتیب که پس از مشورت با متخصصان امر، برای بهترین و مناسب‌ترین حالت هر متغیر از دیدگاه محصول، وزن 10 و برای بدترین حالت (نامناسب برای کشت)، وزن صفر منظور گردید. در بین متغیرهای اقلیمی مورد بررسی، بیشترین وزن (به ارزش 10) به میانگین بارندگی سالانه اختصاص یافت و این ارزش بر حسب اهمیت، بین سه دوره زایشی (ارزش 2)، رویشی (ارزش 7) و رکود (ارزش 1) تقسیم شد. به‌همین‌ترتیب، میانگین دما با ارزش 8 و سپس سایر متغیرهای اقلیمی با ارزش‌های کمتر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. شایان ذکر است که دوره رکود (دوره خواب) زعفران از اهمیت کمتری نسبت به دوره‌های حساس زایشی و رویشی برخوردار است. وزن‌های متغیرهای اقلیمی در دوره‌های سه‌گانه رشد زعفران در جدول ۴ ذکر شده است.

جدول (۴) وزن‌ها (ارزش‌های) هر یک از متغیرهای اقلیمی در دوره‌های سه‌گانه رشد زعفران

مجموع ارزش	دوره‌ها			پارامتر
	رکود	رویش	زایش	
۱۰	۱	۷	۲	بارش
۸	۱	۵	۲	میانگین دما
۶	۰	۴	۲	میانگین حداقل دما
۶	۰	۳	۳	میانگین حداکثر دما
۵	۰	۳	۲	ساعات آفتابی
۴	۰	۲	۲	روزهای یخندهان
۳	۰	۲	۱	حداقل مطلق دما
۳	۰	۲	۱	حداکثر مطلق دما
۳	۰	۱	۲	رطوبت نسبی میانگین
۳	۰	۱	۲	رطوبت نسبی صبح
۳	۰	۱	۲	رطوبت نسبی عصر


۱۴- Rate-Weighting Method


۱۵- Environmental Systems Research Institute

در مرحله بعد، با توجه به آستانه‌های جدول ۳، وزن‌ها بر اساس ارقام جدول ۴ برای هر ایستگاه اعمال شد و بدین ترتیب، اهمیت هر متغیر در هر ایستگاه برای هر دوره رشد مشخص گردید. برای نمونه، در مثال پیش گفته در مورد ایستگاه زرینه، چون میانگین دمای این ایستگاه در دوره‌های زایشی و رکود، به ترتیب از $10/5$ و $25/2$ درجه سانتی گراد بیشتر بود و بنابراین، شرایط برای کشت محصول مناسب نبود (جدول ۳)، از نظر دمای میانگین به این دو دوره، ارزش صفر (نامناسب برای کشت)، و در دوره رویشی، چون میانگین دما از $11/2$ درجه سانتی گراد کمتر بود و بنابراین، شرایط برای کشت مناسب بود، بر اساس وزن‌های جدول ۴، ارزش ۵ اختصاص یافت. بدین ترتیب، ایستگاه زرینه از نظر میانگین دما، با جمع زدن دو ارزش صفر و یک ارزش ۵، مجموعاً حائز ارزش ۵ گردید (شکل ۳، نقشه میانگین دما). در مرحله بعد، بر اساس وزن‌های به دست آمده در هر ایستگاه، نقشه‌های رستری هر متغیر اقلیمی برای هر دوره رشد تهیه شد. این کار با استفاده از نرم افزار ArcGIS با میانیابی به روش Kriging و پیکسل‌هایی به ابعاد 50×50 متر انجام گرفت. بدین ترتیب 33 نقشه (11 متغیر اقلیمی طی سه دوره رشد) حاصل گردید. همان‌طور که گفته شد، با جمع زدن وزن‌های هر متغیر اقلیمی در سه دوره رشد، مجموعاً 11 نقشه به تعداد متغیرهای اقلیمی به دست آمد (شکل ۳). بدین‌هی است بر مبنای مطالب پیش گفته، در نقشه تلفیقی هر متغیر، هر پیکسل ارزشی بین صفر (نامناسب) تا حداقل ارزش ذکر شده در ستون آخر جدول ۴ خواهد داشت. بعد از تهیه 11 نقشه مربوط به متغیرهای اقلیمی، با میانگین‌گیری از ارزش‌های پیکسل‌های این 11 نقشه، نقشه تلفیقی تابع کشت از دیدگاه متغیرهای اقلیمی مورد بررسی در این پژوهش به دست آمد (شکل ۳). در آخرین مرحله، با عنایت به اینکه کشت زعفران در محدوده ارتفاعی 1300 تا 2300 متر و شبکه کمتر از 8 درصد توصیه شده است (فرج‌زاده و میرزاپوری، $1386: 73$ و یزدچی و همکاران، $1389: 154$)، لذا محدوده‌های یادشده با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) منطقه، استخراج و با نقشه تلفیقی متغیرهای اقلیمی (شکل ۳، تلفیق 11 متغیر) مقایسه شدند تا نقشه نهایی تناسب کشت به دست آید (شکل ۴).


یافته‌های پژوهش

یازده نقشه تناسب اقلیمی، به تعداد یازده متغیر اقلیمی که در فوق توضیح داده شد و نیز نقشه تلفیقی متغیرها که وضعیت تناسب اقلیمی منطقه را برای کشت زعفران نشان می‌دهد، در شکل ۳ نشان داده شده است. شکل ۴ نیز نقشه نهایی قابلیت اقلیمی کشت زعفران را در منطقه پس از لحاظ کردن محدوده‌های ارتفاعی مناسب و شبکه‌های قابل قبول برای کشت نشان می‌دهد. با توجه به شکل ۴، نزدیک به $30/48$ درصد از مساحت منطقه (معادل 16500 کیلومتر مربع) واقع در جنوب، شرق و شمال‌شرق منطقه که عمدها دشت‌های غرب کرمانشاه، جنوب روانسر، اطراف قروه و با مساحت کمتر، حوالی کنگاور، بیجار، زرینه و سقز را پوشش می‌دهد، قابلیت متوسطی برای کشت زعفران دارد. بخش بسیار کوچکی با حدود $0/04$ درصد از مساحت منطقه در غرب روانسر دارای قابلیت متوسط به پایین است. در بقیه مساحت منطقه، مشتمل بر حدود 37600 کیلومتر مربع ($69/48$ درصد از مساحت منطقه)، عمدها به دلیل ناسازگاری عناصر اقلیمی و ارتفاع و شبکه زیاد، قابلیت مناسبی برای کشت زعفران وجود ندارد.





شکل ۳) نقشه‌های قابلیت اقلیمی کشت زعفران در استان‌های کرمانشاه و کردستان (اعداد داخل پرانتز: وزن)



شکل ۴) نقشه نهایی قابلیت اقلیمی کشت زعفران در استان‌های کرمانشاه و کردستان (اعداد داخل پرانتز: وزن)

نتیجه‌گیری

نواحی مساعد برای فعالیت‌های کشاورزی در کشور ما اغلب بر پایه تجربه شکل گرفته و مکانیابی‌های علمی در آن دخالت چندان مؤثری نداشته است. چه بسا محدوده‌های وسیعی در سطح کشورمان وجود دارد که استعداد بالایی برای انجام فعالیت‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های کشاورزی داشته باشد؛ اما بهدلیل ناشناخته بودن ظرفیت‌های آن، مورد استفاده شایسته قرار نگرفته است. اراضی کشاورزی و به خصوص اراضی که زیر کشت زعفران هستند، با توجه به درآمد و استغلال‌زاوی بالا نقش مهمی در اقتصاد کشور به خصوص اقتصاد مناطق روستایی دارند. هم اکنون، اگر عملکرد زعفران را در کشور به طور میانگین $3/9$ کیلوگرم در هکتار با قیمت متوسط 4 میلیون تومان بدانیم، فروش سالیانه محصول به ازای یک هکتار زمین، به طور متوسط به $15/6$ میلیون تومان خواهد رسید. این درآمد می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا کند. از دیدگاه جغرافیایی، تأثیر بارز توسعه کشت این محصول در سازمان فضایی و وضعیت چشم‌اندازهای جغرافیایی منطقه انکارناپذیر است و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، شاهد بازخوردهای مثبت این مسئله در نظام برنامه‌ریزی کلان خواهیم بود. این پژوهش در جستجوی یافتن نواحی دیگری برای کشت محصول زعفران در کشور به جز نواحی سنتی کشت آن در شمال شرق کشور با توجه به شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه بوده است.

با توجه به یافته‌های پژوهش، نزدیک به $30/48$ درصد از مساحت منطقه (معادل 16500 کیلومتر مربع) که عمدتاً دشت‌های غرب کرمانشاه، جنوب روانسر و اطراف قروه را پوشش می‌دهد، قابلیت متوسطی برای کشت زعفران دارد. بقیه سطح منطقه قابلیت برای این فعالیت ندارد. در مقایسه با این پژوهش، در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی، که آب‌وهایی سردتر از دو استان مورد مطالعه در این پژوهش دارد، با استفاده از مدل AHP تقریباً 11 درصد از مساحت منطقه دارای قابلیت مناسب یا نسبتاً مناسب (یزدچی و همکاران، 1389 ؛ 168)، و در دشت نیشابور با چهار روش مختلف وزن دهی، 6 تا $21/4$ درصد از سطح دشت دارای قابلیت مناسب برای کشت زعفران معرفی شدند (فرج‌زاده و میرزاپیاتی، 80 ؛ 1386). تفاوت در مقدار مساحت‌ها در مطالعات مختلف وابستگی تمام به ویژگی‌های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و تعداد و نحوه وزن دهی پارامترها دارد. باید در نظر داشت که چون هدف این پژوهش، یافتن مکان‌های مناسب برای کشت محصول با نیت تغییر کاربری‌های موجود بوده است، لذا کاربری‌های فعلی مدت‌ظر قرار نگرفته و طبیعتاً محدوده‌های آنها نیز استخراج نشده است تا در صورت ضرورت بتوان در آینده با تغییر کاربری موجود نسبت به کشت محصول اقدام نمود. چنانچه در مدل وزن دهی نسبتی، تعیین وزن‌ها بر اساس کار کارشناسی مناسب صورت گیرد (که در این پژوهش نیز سعی بر همین بوده است) قطعاً نتایج رضایت‌بخشی حاصل خواهد شد. برای رسیدن به نتایج بهتر در مطالعات آینده پیشنهاد می‌شود طیف وسیع تری از متغیرهای اقلیمی در تعداد بیشتری از ایستگاه‌های ثبت عناصر اقلیمی مدنظر قرار گیرد.

منابع

- ۱- ابراهیم‌زاده، عیسی و جواد بذرافشان. (۱۳۸۶). مدل پخش فضایی هاگاستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان، جغرافیا و توسعه، ش، ۹، زاهدان، صص $57-76$.
- ۲- ابریشمی، محمدحسن. (۱۳۶۶). شناخت زعفران ایران، تهران: توس.

- ۳ - (۱۳۸۳). زعفران از دیر باز تا امروز، تهران: امیر کبیر.
- ۴ - امیر قاسمی، تراب. (۱۳۸۰). زعفران، طلای سرخ ایران، مشهد: نشر آیندگان.
- ۵ - بری ابرقویی، حسین. (۱۳۷۸). ارتباط عمر زعفران با گل دهی در شرایط آب و هوایی کرج، نیوار، ش ۴۱، تهران: صص ۱۲-۴.
- ۶ - حبیبی، محمد باقر و عبدالرضا باقری. (۱۳۶۸). زعفران، فرآیند ترکیبات شیمیایی و استانداردهای آن، مشهد: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران.
- ۷ - خواجه پور، محمدرضا. (۱۳۷۲). تولید زعفران، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان.
- ۸ - رحمانی، صفت‌اله. (۱۳۸۵). بررسی اهمیت اقتصادی و اجتماعی زعفران و عوامل مؤثر در آن، زیتون، ش ۷۰، تهران، صص ۹-۱.
- ۹ - شاه علایی، مصطفی. (۱۳۵۲). دستور زراعت زعفران و سودهای آن، تهران: ناشر وزارت کشاورزی.
- ۱۰ - شیانی، داریوش، جواد احمدیان و رضا شیرمحمدی. (۱۳۸۱)، پیشنهاد زعفران در جهان، بولتن علمی پژوهشکده اقلیم‌شناسی، ج ۴، ش ۲، مشهد، صص ۶-۱۲.
- ۱۱ - عظیمی حسینی، محمد؛ محمد‌هادی نظری فر و رضوانه مؤمنی. (۱۳۹۰). کاربرد GIS در مکان‌یابی، تهران: انتشارات مهرگان قلم، چاپ دوم.
- ۱۲ - علایی طالقانی، محمود. (۱۳۸۷). ژئومورفولوژی ایران، تهران: نشر قومس، چاپ پنجم.
- ۱۳ - علیجانی، بهلول. (۱۳۸۴). آب و هوای ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- ۱۴ - علیزاده، امین؛ نسرین سیاری؛ جواد احمدیان و آزاده محمدیان. (۱۳۸۸). بررسی مناسب‌ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ج ۲۳، ش ۱، مشهد، صص ۱۰۹-۱۱۸.
- ۱۵ - فرج‌زاده، منوچهر و رضا میرزاپیاتی. (۱۳۸۶). امکان‌سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت نیشابور با استفاده از GIS، مدرس علوم انسانی (برنامه‌ریزی و آمایش فضایی)، ش ۵۰، تهران، صص ۶۷-۹۱.
- ۱۶ - طباطبایی، محمد. (۱۳۶۵). گیاه‌شناسی کاربردی، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- ۱۷ - کافی، محمد. (۱۳۸۱). زعفران، فناوری تولید و فرآوری، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
- ۱۸ - محمدی، حسین و مجید کریم‌پور ریحان. (۱۳۸۴). امکان‌سنجی اقلیمی کشت زعفران در جنوب شهرستان سبزوار، ییابان، ج ۱۰، ش ۱، صص ۲۲۳-۲۴۸.
- ۱۹ - مصطفایی، جواد؛ جواد فتاحی و بنفشه شاه‌علی. (۱۳۸۳). سالنامه آماری استان کرمانشاه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه: انتشارات تاق‌بستان.
- ۲۰ - یزدچی، سعید؛ علی اکبر رسولی؛ حسن محمودزاده و محمد زرین‌بال. (۱۳۸۹). سنجش قابلیت اراضی شهرستان مرند برای کشت زعفران بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، دانش آب و خاک، ج ۲۰، ش ۳، صص ۱۵۱-۱۷۰.

- 21- ESRI (Environmental Systems Research Institute), 1996, Arcview Spatial Analyst, Advanced Spatial Analysis Using Raster and Vector Data, New York.
- 22- Rangahau, M. K., 2003, Growing Saffron - The World's Most Expensive Spice, *Crop and Food Research*, 20: 1-4.
- 23- Rezvani, N. Sorooshzadeh, A. and Farhadi, N., 2012, Effect of Nano-Silver on Growth of Saffron in Flooding Stress, *International Journal of Medical and Biological Sciences*, 6: 41-46.
- 24- McGimpsey, G. A. and M. H. Douglas, 1997, Evaluation of Saffron (*Crocus Sativus L.*) Production in New Zealand, *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science*, 25: 159-168.
- 25- Azizbekova, N. Sh., Milyaeva, E. L., Lobova, N. V. and Chailakhyan, M. Kh., 1978, Effects of Gibberellin and Kinetin on Formation of Flower Organs in Saffron Crocus, *Soviet Plant Physiol*, 25(3): 471-476.

